



# АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ:

## ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ

**Африканская чума свиней (АЧС)** – опасное вирусное заболевание, развивающееся остро или молниеносно: от двух-трех дней – до нескольких часов. Отнесена к Списку А (особо опасные инфекции) Международной классификации заразных болезней животных. Не представляет опасности для человека, но губительна для животных (летальный исход – до 100%)

### Возбудитель

#### Вирус семейства *Iridoviridae*

Установлено несколько сероиммунно- и генотипов вируса африканской чумы свиней.

Его обнаруживают в крови, лимфе, во внутренних органах, секретах и экскретах больных животных.

Вирус устойчив в широком диапазоне температур и pH среды, включая замораживание, высушивание и гниение. При температуре 70°C инактивируется в течение 10 минут.

Сохраняет жизнеспособность от 2 до 6 месяцев во всех выделениях больных животных, на объектах внешней среды, в почве, а также в мясных продуктах.

### Пути передачи инфекции

Контакт с больными животными;

через корма, пастбища, транспортные средства, загрязненные выделениями больных;

использование в корм животных отходов столовых, ресторанов, санитарных боен;

переносчиками могут быть хищные птицы и звери, грызуны, насекомые, навозные паразиты (некоторые виды клещей и вши), домашние и дикie животные, бывшие в контакте с больными и павшими свиньями.

### СИМПТОМЫ И ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ



**При молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно, без характерных признаков**

**При остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы:**

Больные животные большую часть времени лежат, вяло поднимаются и быстро устают

посинение кожи на ушах и пяточке  
слизисто-гнойные выделения из носа и глаз

на коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они бледнеют

сильная жажда  
одышка

у больных животных раскручивается хвост



Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить через несколько часов после появления первых клинических признаков.



**Вакцины против этого заболевания нет!**

### Борьба

Поголовье свиней в очаге заболевания полностью ликвидируется бескровным методом;

трупы свиней, навоз и остатки корма, а также предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая с известью;

деревянные помещения, полы и решетки также сжигают, каменные помещения, где содержались животные и территории ферм дезинфицируются горячим 3% раствором едкого натрия и 2% раствором формальдегида;

на расстоянии 10 км вокруг неблагополучного пункта все свиноголовье убивают, а мясо утилизируют на специализированных предприятиях;

карантин снимается через 6 месяцев с момента последнего случая падежа, а разведение свиней разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина;

в случае возникновения угрозы заноса и распространения вируса АЧС уничтожается все свиноголовье, которое содержится в хозяйствах, не отвечающих требованиям III и IV уровней биологической защиты.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАВИСИТ ОТ ИХ СВОЕВРЕМЕННОСТИ И ПОЛНОТЫ ПРИНИМАЕМЫХ МЕР.**

**АЧС НАСТОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ЧТО ДАЖЕ НА ОЗДОРОВЛЕННЫХ ПОСЛЕ НЕЕ ТЕРРИТОРИЯХ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ ЕЩЕ 15 ЛЕТ, тогда как при ящуре и чуме крупного рогатого скота, например, - только 5 лет.**

По всем вопросам обращаться в ФБУ «Ветеринарный центр» в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе.

- 8 (3466) 42-29-45; 42-29-42; 21-48-59; 45-28-09; 45-18-28 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:12,